

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **Manni-Plex Vegetable**: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro, lentes protectores de plástico transparente, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo, para evitar el contacto directo. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento, no coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación. Después de manejar o aplicar **Manni-Plex Vegetable** báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”

“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. Si cayó en los ojos, lavar con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si **Manni-Plex Vegetable** cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón. En caso de intoxicación lleve al paciente con el doctor y muéstrele la etiqueta. Antídoto: tratamiento sintomático. No existen antecedentes de intoxicación diagnosticados por **Manni-Plex Vegetable**.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.

“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”

“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”

“RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

MANNI-PLEX[®] VEGETABLE

Fertilizante Inorgánico
Líquido

COMPOSICION GARANTIZADA

Nitrógeno (N)	5.00%
Magnesio (Mg)	1.80%
Boro (B)	0.40%
Cobre (Cu)	1.25%
Manganeso (Mn)	0.90%
Zinc (Zn)	0.90%

REG. RSCO-0182/IX/2012

Lote: xxxxxxx

Fecha fabricación: xx de xx 2012

CONT. NETO 0,946 L

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS A PARTIR DE SU FECHA DE FABRICACIÓN.

FABRICADO Y EVASADO POR:

Brandt Consolidated, Inc.

Domicilio:

2935 South Koke Mill Road

Springfield, Illinois 62711

Estados Unidos de América

Teléfono: (217) 547 5840



HECHO EN E.U.A

INSTRUCCIONES DE USO

Manni-Plex Vegetable es un producto líquido a base de Nitrógeno y microelementos necesarios para la planta. Esta indicado para aplicación foliar o radicular, lo cual permite una rápida respuesta de los cultivos. La deficiencia de nitrógeno se observa en las hojas viejas, se ven hojas de color pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las venas. Aunque la clorosis llegue a toda la planta no crece, el follaje es escaso. La deficiencia de magnesio se presenta como clorosis general en la planta principalmente en las hojas viejas por falta de clorofila, la clorosis es de tipo interveinal en las hojas. La deficiencia de boro se manifiesta como deformación e las hojas enrollamientos, detención de crecimiento y muerte de tejidos; la planta tiene un aspecto “arrosentado”, muerte de los puntos meristemáticos. La deficiencia de fierro se presenta con frutos irregulares, manchas pardas o rojizas en la superficie de los frutos, reducción del crecimiento de los brotes jóvenes, aspecto clorótico y marchito de las plantas. La deficiencia de manganeso suele aparecer generalmente sobre las hojas maduras y venas presentar un tamaño anormal; provoca una clorosis, entre venas (verde claro) resaltando la red de venas principales. La deficiencia de zinc provoca la aparición de clorosis entre las venas secundarias de las hojas, detención parcial del crecimiento de la planta, reducción de la superficie foliar y tamaño de los brotes. Cuando se aplica **Manni-Plex Vegetable** es recomendable lograr un mejor cubrimiento de la superficie foliar. Se sugiere hacer aplicaciones temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis L/ha diluir en 200 -600 L de agua	Época de Aplicación
Lechuga, brócoli, apio, coliflor, col, col de Bruselas.	2-4	1 a 4 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Chile, jitomate, tomate, papa, tabaco, café, ajo, cebolla, melón, sandía, pepino, calabaza.		
Naranja, Limón, Toronja, Manzano, Ciruelo, Fresa, Zarzamora		
Plátano, aguacate, piña, papaya, guayaba		
Ornamentales de flor		
Papa, betabel, soya, algodón, trigo, cebada, arroz, maíz, avena, alfalfa		

Para aplicación al suelo: de 4 a 8 litros por hectárea, de 2 a 5 aplicaciones por ciclo de cultivo.

Para aplicación Fertirrigación: de 4-8 Litros por hectárea, de 2 a 4 aplicaciones por ciclo de cultivo.

METODOS Y DOSIS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:
Agite perfectamente el envase antes de usar **Manni-Plex Vegetable**, agar con cuidado el envase, mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad indicada de **Manni-Plex Vegetable**; mezcle en una cubeta la cantidad de producto a utilizar con agua agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

BRANDT

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DISTRIBUCIONES IMEX, S. A. DE C. V.

Josefa Ortiz de Domínguez No. 24

Col. Agua Blanca Industrial C.P. 45235

Zapopan, Jalisco, México

Tel: (33) 3283-4639