

BRANDT® 4% Mg

Fertilizante Inorgánico Líquido Soluble

Composición Garantizada

Magnesio (Mg)4.0% p/v
Azufre (S)5.0% p/v

Registro Sanitario: RSCO-053/IV/21

Lote: xxxxxxx

Fecha de fabricación: DD/MM/YYYY

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

Contenido Neto: 10 litros

Titular del Registro y Distribuido por:



Distribuciones IMEX

Distribuciones Imex, S.A. De C.V
Josefa Ortiz de Domínguez No. 24
Col. Agua Blanca Industrial CP.45235
Zapopan, Jalisco, México
Tel: (33) 3283-4639



HECHO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Fabricado y envasado por:

BRANDT®

BRANDT Consolidated, Inc.
2935 South Koke Mill Road
Springfield, Illinois 62711 EEUU
+1 217 547 5840
www.brandt.co 2023-08

BRANDT® 4% Mg

“ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **BRANDT 4% Mg**: camisa de manga larga de algodón y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtros para nieblas o vapores, lentes de plástico, guantes de neopreno, botas de hule con casquillo para evitar el contacto directo. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de aplicar el producto lave el equipo de aplicación para evitar deterioro. No coma, beba o fume durante el manejo y la aplicación. Evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. Después de manejar y aplicar el producto báñese, cámbiese de ropa y lave ésta por separado antes de volver a usarla. El equipo de protección y el producto utilizado se debe almacenar en el lugar de trabajo.

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”
“NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de sobreexposición; retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa; manténgala bien abrigada y en reposo. En caso de inhalación: retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado. Si el producto cayó en los ojos: lavar con abundante agua limpia por lo menos 15 minutos, consulte a un médico. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir, consulte a su médico. Si el producto cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”
“RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”
“NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
“NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”
“RESPETE LAS DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

BRANDT 4% Mg es un fertilizante en presentación líquida que contiene en su formulación magnesio y azufre. **BRANDT 4% Mg** ayuda a prevenir y corregir deficiencias de magnesio y azufre. Se sugiere hacer aplicaciones de **BRANDT 4% Mg** temprano en la mañana o por las tardes para evitar temperaturas mayores a 35°C.

“APLICACIÓN FOLIAR”

Cultivo	Dosis (L/ha)	Época de Aplicación
HORTALIZAS Jitomate, Chile, Pimiento, Col, Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas, Lechuga, Espinaca, Acelga, Perejil, Cilantro, Epazote, Tomate de cáscara, Berenjena, Alcachofa, Frijol, Ejotero, Espárrago, Nopal, Calabacita, Melón, Pepino, Sandía, Calabaza, Chayote, Cebolla, Cebollín, Ajo, Papa, Jícama, Camote, Betabel, Zanahoria, Nabo y Rábano	2.5 - 5	Aplicar a partir de los 15 días de emergencia o trasplante, durante el ciclo del cultivo y después del primer corte, cuando se presente deficiencia.
FRUTALES Frambuesa, Zarzamora, Fresa, Arándano, Durazno, Peral, Ciruela, Vid, Uva de Mesa, Manzano, Nogal, Limón, Naranja, Lima, Mandarina, Toronja, Mango, Guayaba, Café, Rambután, Aguacate, Papayo, Piña y Plátano	2.5 - 5	Aplicar cuando se presenten deficiencias, en cítricos aplicar durante todo el ciclo, en desarrollo de follaje y frutos.
ORNAMENTALES Rosa, Clavel, Gerbera, Gladiola, Aster, Crisantemo, Solidago, Polar Godomiz, Gypsophylla, Orientales y Tulipán	2.5 - 5	Aplicar durante el desarrollo vegetativo o cuando se presenten deficiencias.
GRANOS Maíz, Sorgo, Arroz, Trigo, Cebada, Avena, Caña de Azúcar, Frijol, Garbanzo, Chicharo, Lenteja, Haba y Soya	2.5 - 5	Aplicar a partir de los 15 días de emergencia del cultivo, cuando se presenten deficiencias, al embuche.
FORRAJES Alfalfa, Ebo o Veza, Zacate Raygrass, Zacate Bermuda y Zacate Taiwán	2.5 - 5	Aplicar a partir de los 15 días de emergencia del cultivo, cuando se presenten deficiencias, al embuche. Después de cada corte.
CULTIVOS INDUSTRIALES Algodón, Girasol, Ajonjolí, Canola, Cártamo y Agave	2.5 - 5	Aplicar a los primeros síntomas de deficiencia, en agave durante la época de lluvias.

“MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal, tomando en cuenta las recomendaciones en el apartado “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”, agite perfectamente el envase antes de usar **BRANDT 4% Mg**, gire la tapa hasta romper el arillo de plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase, mida la cantidad indicada de producto con una probeta de plástico o algún otro utensilio graduado específico para este uso, mezcle en una cubeta la cantidad de **BRANDT 4% Mg** a utilizar con agua limpia, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión.

AVISO DE GARANTÍA

Debido a que sale del alcance de DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. la empresa no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.